Actualités régionales sur l'HDM : où en est-on depuis l'an dernier ?

D. Verjat-Trannoy
CPIas IDF

	JHDM 2018	JHDM 2019
Evaluation HDM (ES, EMS)	Résultats 2017 Quick-audit HDM Grephe	Résultats 2018 - Quick-audit HDM Grephe Echanges sur une évaluation annuelle (A1) Outil bientôt disponible pour le secteur hémodialyse (A. Gaudichon)
Formation initiale (ES, EMS, ville)	Résultats enquête EOH	Projet toujours en cours (IFSI, IFAS...) Travail avec écoles Ibode/lade
Travail sur les opportunités de friction (ES)	Résultats IOF 2017	Résultats IOF 2018 REX expérimentation en EMS (I. Roland)
Diagnostic des freins (ES, EMS, ville)	Ebauche d'un outil	Outil mis à disposition Résultats de tests (N = 158 soignants) Résultats de mise en œuvre (N > 10 000) REX médecin urgentiste (A. Andolfo) Echanges sur certains freins (A2, A3)
Valorisation des actions Partage des outils (ES, EMS, ville)	Outil de recueil	Résultats Affichage des supports – vote REX actions locales innovantes (O. Meunier) REX campagnes régionales (S. Perron, V. Jan) Site CPIas IDF - Base documentaire Répias
Implication des patients (ES, EMS, ville)	Pistes de travail	REX mise en place en EHPAD (C. Ayekoué) Projet HAS questionnaire patient HDM

Remerciements (1)

Etablissements d'IDF ayant accepté d'aider à la conception de nouveaux outils : relecture ou test (exemple : test en conditions réelles du diagnostic des freins et retour de données*)

- Hôpital Emile Roux-APHP*** (A. Akpabie)
- Clinique Saint-Jean l'Ermitage*** (C. Desjacques)
- Hôpital Foch*** (F. Karnycheff)
- HIA Bégin*** (A. Gérard)
- GH Diaconesses-Croix Saint Simon*** (F. Diaw)
- CH de Plaisir** (C. Nicolas)
- CH de Provins** (L. Cloutrier)
- CH de Rambouillet** (C. Noël)
- HP Jacques Cartier** (C. Bounhiol)
- HP d'Antony** (C. Bounhiol)
- EPS Ville-Evrard** (H. Jarretie)
- CAS de la ville de Paris** (P. Barrière)
- GH Pitié-Salpêtrière-APHP** (C. Tamamès)
- Hôpital Joffre-Dupuytren-APHP** (I. Rimbart)
- Hôpital Georges Clémenceau-APHP** (I. Runigo)
- Hôpital Coirentin Celton-APHP** (V. Moulin)

+ 1 ES hors IDF :
CH et EHPAD de Meximieux*
(F. Van Loostveldt)

Point sur le diagnostic des freins à l'HDM et à l'utilisation des PHA

CONSTAT / situation actuelle

Principe de la démarche proposée

Rappels chronologiques

Octobre 2018 : présentation du principe de l'outil
(interne en pharmacie → thèse) – Recueil avis EOH freins

Décembre 2018-Janvier 2019 : test dans 6 ES de la 1^{ère} version de la grille (5 ES et 1 EMS) – 158 professionnels

Février 2019 : mise en ligne de la grille de diagnostic

Avril 2019 : outil informatique + rapport expérimentation/test

Mai 2019 : 1^{ère} fiche « action »

Juillet 2019 : 2^{ème} fiche « action »

Novembre-décembre 2019 : fiches « action » suivantes

Comparaison des avis sur les freins EOH versus professionnels de santé

Classement	Avis des EOH (N = 96)		Avis des professionnels (N = 158)	
1	Crainte toxicité PHA	73%	Problème tolérance	66%
2	Charge de travail	72%	Crainte toxicité PHA	30%
3	Problème tolérance	66%	Charge de travail	24%
4	Influence personnel peu observant	59%	Manque d'attention/oubli	13%
5	Faible engagement institutionnel	52%	Pb disponibilité PHA	11%
6	Doute efficacité PHA	51%	Pb conditionnement PHA	9%
7	Manque d'attention/oubli	47%	Doute efficacité PHA	8%
8	Manque de formation	33%	Pb emplacement PHA	7%
9	Pb emplacement	16%	Influence personnel peu observant	4%
10	Pb disponibilité	6%	Manque de formation	4%
11	Pb conditionnement	3%	Faible engagement institutionnel	4%

La grille finale

Date : / /

Hygiène des mains et produits hydro-alcooliques :

Votre avis nous intéresse ! Merci de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête qui vise à identifier les éventuelles difficultés rencontrées par les professionnels de santé.

Unité/service/secteur : _____

LE QUESTIONNAIRE (anonyme) ☑ Ceci n'est pas une évaluation des connaissances

Précision importante : aucun questionnaire contient le terme « hygiène des mains », c'est qu'elle ne concerne pas uniquement la friction mais les différentes techniques disponibles (friction et lavage)

A – Mieux connaître votre situation professionnelle

1-Vous êtes : une femme un homme

2-Vous êtes né(e) : avant 1965
 entre 1965 et 1979
 entre 1980 et 1994
 entre 1995 et 2009

3-Vous exercez une profession :
 paramédicale/laquelle : _____
 médicale/laquelle : _____
 autre/laquelle : _____

4-Vous exercez cette profession depuis _____/ans (au moins dans ce profession)
 (si moins d'un an, notez « < 1 »)

Dans l'unité, le service ou le secteur où vous exercez actuellement :
 5-Vous êtes en activité depuis _____/ans (si moins d'un an, notez « < 1 »)

6-En mode : salarié libéral

7- Nombre moyen de personnes prises en charge chaque jour personnellement : _____/patients, résidents, enfants, usagers.

B – Mieux connaître vos pratiques et ce qui les influence

1- Pour vous, quelle importance l'hygiène des mains a-t-elle dans la prévention du risque infectieux ? Elle a un rôle limité un rôle assez important un rôle majeur

2- Concernant la friction hydro-alcoolique, vous la considérez comme :
 « superflue »
 Dans la mesure du possible
 Privilégiée
 Essentielle

3- Niveau de connaissance :
 Grand
 Utilisateur modéré (vous utilisez les SHA mais le lavage à l'eau et au savon est encore assez fréquent)
 Utilisateur occasionnel (quand vous faites une hygiène des mains, vous privilégiez le lavage à l'eau/lavon)
 Non-utilisateur (utilisez des SHA vous posez problème)

Avis des professionnels sur l'HDM et les PHA

Date de proposition par le CHU de Dijon : Février 2019

connaître vos pratiques et ce qui les influence (suite)

Comment, lorsqu'il s'agit de la prise en charge d'un patient/résident, vous pensez-vous être en mesure de respecter les recommandations ?

avant 1^{er} contact avec le patient

avant un geste invasif

Exposition à un liquide biologique

Dernier contact : avec le patient

_____ avec son environnement

de l'hygiène des mains :

une contrainte importante ? (l'effort est supérieur au bénéfice attendu)
 une contrainte modérée ? (le bénéfice attendu justifie l'effort)
 n'est pas une contrainte ? (il n'y a ni effort ni bénéfice attendu)

connaître vos difficultés sur l'hygiène des mains et les SHA

des freins à dénombrer 3 approchés par certains professionnels de santé, indiqués, en ce qui est un ceux qui vous concernent personnellement au sein de votre service :

l'hygiène des mains en général **Concernant la friction hydro-alcoolique :**

Effectuez pas toujours parce que c'est trop long ou que ça sent mauvais...
 11-Doute sur l'efficacité de la friction hydro-alcoolique par rapport au lavage à l'eau/lavon ou la sélection de micro-organismes à des infections...
 12-Problème de tolérance des SHA...
 13-Problème de disponibilité des SHA...
 14-Problème de coût des SHA...
 15-Problème de formation des professionnels de santé...
 16-Problème de connaissance des recommandations...
 17-Problème de disponibilité des SHA...
 18- Absence de difficulté dans cette liste (1-17)

2- Parmi les cases cochées, quelle est votre principale difficulté ? N° _____ / Si réponse, au 1 et 17

3- Avez-vous d'autres difficultés à signaler ? _____

4- Pourrait vous aider à optimiser votre hygiène des mains ou l'utilisation des SHA ? _____

Merci pour votre participation !

Date de proposition par le CHU de Dijon : Février 2019

Temps de remplissage : 5 min (10 min max)

Point sur le diagnostic des freins

Analyse des résultats multicentriques

Résultats au 1^{er} octobre 2019

- **132** ES inscrits sur l'application informatique
(dont 82 en IDF ; 62%)
- 2 stratégies :
 - ciblée sur services en difficulté (ICSHA, observance)
 - généralisée à l'ensemble des services
- **10 680** professionnels ont rempli la grille
(dont 6 658 en IDF ; 62%)
- Consultation page dédiée du site CPias IDF : 2332 vues (juillet-octobre)
- Téléchargements sur site Répias : 615

Caractéristiques des ES/services

Catégorie	Nombre
CH	44
SSR	24
MCO	22
CHU	16
PSY	6
HAD	4
Dialyse	3
CLCC	2
HIA	1
SLD	1
EHPAD	9
Total	132

Spécialité des services	Répartition (% de grilles) (N = 10 680)
Médecine	20,8
Chirurgie/bloc/SSPI	12,3
Gynécologie/obstétrique	4,4
Réanimation	6,5
USI/USC	2,3
Urgences	5,4
Dialyse	3,2
Secteurs médico-techniques	4,8
SSR	15,6
SLD	3,4
Psychiatrie/Santé mentale	8,0
Services médico-sociaux	5,4
Autre	7,9

Caractéristiques des professionnels

Nés avant 1965	> 55 ans	13%
1965-1979	40-54 ans	33%
1980-1994	25-39 ans	44%
à partir de 1995	< 25 ans	10%

90% de salariés

244 cadres paramédicaux ont participé

Questions préalables aux freins : avis des professionnels sur l'HDM

→ HDM = mesure de prévention importante pour la prévention du RI ?
Répartition en %

L'HDM est considéré comme une mesure de prévention importante pour presque 90% des professionnels

→ HDM = contrainte ? Répartition en %

→ L'HDM n'est pas une contrainte pour environ 60% des professionnels
→ 1/3 semble s'en accommoder
→ 10% sont réellement gênés

Répartition des réponses (%)

Les 10 réponses les plus fréquentes (80% des professionnels)

Avant 1 ^{er} CONTACT patient (OMS 1)	Avant ACTE INVASIF (OMS 2)	Après RISQUE D'EXPOSITION À UN LB (OMS 3)	Après dernier CONTACT avec patient (OMS 4)	Après dernier CONTACT avec l'environnement du patient (OMS 5)	Fréquence des réponses
systematique	systematique	systematique	systematique	systematique	50%
systematique	systematique	systematique	systematique	Si possible	10%
Si possible	systematique	systematique	systematique	systematique	5%
Si possible	systematique	systematique	systematique	Si possible	3%
systematique	systematique	systematique	systematique	Fn du patient	2,5%
Si possible	systematique	systematique	Si possible	Si possible	2,5%
systematique	systematique	systematique	Si possible	Si possible	2%
systematique	systematique	systematique	systematique		1,5%
systematique	systematique	Non nécessaire	systematique	systematique	1,5%
Fn du patient	systematique	systematique	systematique	systematique	1%

Identification et fréquence des freins

Nombre de freins déclarés par professionnel

(N = 9 564 professionnels ayant au moins 1 frein)

(N = 28 046 freins)

Nombre de professionnels

Fréquence des freins

(N = 9564 professionnels ayant déclaré au moins 1 frein)

13,4 % des professionnels n'ont signalé aucun frein

Réponses les plus fréquentes

→ notion de « profils de freins »

N = 2004 réponses différentes
(1 ou plusieurs freins)

N° des freins (nb de freins)	Freins concernés	n	%
12	(1) Tolérance	629	31%
12/13	(2) Tolérance-Toxicité	530	26%
1	(1) Perception du risque infectieux	190	9,5%
13	(1) Toxicité	178	9%
3	(1) Port de gants	175	9%
3/12	(2) Port de gants- Tolérance	168	8%
1/12	(2) Perception du risque infectieux- Tolérance	152	7,5%
3/12/13	(3) Port de gants- Tolérance -Toxicité	145	7%
6	(1) Charge de travail/temps disponible	141	7%
5	(1) Autres priorités	134	7%
5/12	(2) Autres priorités- Tolérance	134	7%
2/12/13	(3) Fréquence demandée trop élevée- Tolérance-Toxicité	124	6%
6/12	(2) Charge de travail/temps disponible- Tolérance	124	6%
6/12/13	(3) Charge de travail/temps disponible- Tolérance-Toxicité	119	6%
2/12	(2) Fréquence demandée trop élevée- Tolérance-Toxicité	113	6%

Répartition des freins principaux

(N = 7041 professionnels ayant renseigné leur frein principal)

34% des professionnels n'ont pas déclaré de frein principal

Etat d'avancement des « actions ciblées »

Présentation des documents
« professionnels »

Efficacité

RECTO

Objectifs :

1-Expliquer la différence entre lavage simple et FHA

2-Argumenter l'efficacité des PHA à travers 3 types d'informations

1

SHA-DOC 2/Professionnels Unité/secteur/service : / _____ /

Vous avez des doutes sur l'efficacité des SHA ?
Voici des éléments d'information : à vous de juger... !

Les hygiénistes disent que les SHA sont « très efficaces » ou « plus efficaces que les savons » mais qu'entend-on par « efficacité » au juste ?

L'EFFICACITE, en termes d'objectif, c'est d'empêcher que les germes vivants, présents sur les mains, ne soient transmis au moment d'un contact (transmission croisée). En effet, parmi eux, il peut y avoir des bactéries pathogènes ou résistantes aux antibiotiques.

Quelles sont les différences entre « lavage au savon doux » et « friction avec une SHA » ?

Mécanismes d'action (bactéries pathogènes ou résistantes aux antibiotiques)

Lavage au savon doux = Nettoyage

En vous lavant les mains à l'eau et au savon doux, vous allez :

- avoir une sensation de bien-être immédiat par élimination des saouilles (« mains propres »)
- vous débarrasser de certains germes (superficiels) mais pas de tous ! → **efficacité partielle**

Attention !
Les germes qui restent sur votre peau ne sont pas tués. D'autres germes peuvent s'y ajouter lors des étapes de rinçage à l'eau et de séchage (non stériles).

C'est utile dans certains cas, mais ce n'est pas suffisant pour lutter contre la transmission croisée !

Friction avec une SHA = Désinfection

En faisant une friction avec une SHA, vous allez :

- détruire tous les germes situés en surface et dans les replis de vos mains → **efficacité totale**
- hydrater vos mains grâce aux émoullissants que contient la SHA.

C'est exactement ce qui est recherché pour lutter contre la transmission croisée.

Impeccable !

CHIAS IDF - Diagnostic des freins à l'hygiène des mains et aux SHA - Doutes sur l'efficacité - juillet 2019 - p. 1/2

VERSO

2

SHA-DOC 2/Professionnels Unité/secteur/service : / _____ /

L'EFFICACITE DES SHA EST JUGÉE PAR LEUR CAPACITÉ À DÉTRUIRE LES GERMES (ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE ÉVALUÉE EN LABORATOIRE) ET À RÉDUIRE LES TAUX D'INFECTIONS (ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE TERRAIN).

Résultats de tests en laboratoire
(laboratoires spécialisés publics ou privés, accrédités, indépendants des fabricants)

Normes européennes EN 13727, EN 13624, EN 14476
Les SHA sont soumis à des essais « in vitro » dans des conditions standardisées (mise en contact avec des germes de référence dans des tubes à essai).

Norme européenne EN 1500
Les SHA sont soumis à des essais type « essais cliniques » sur un échantillon d'adultes volontaires sains. Les volontaires effectuent une friction après que leurs mains ont été contaminées par une bactérie de référence. Les résultats sont comparés à un produit de référence.

On vérifie à l'aide de ces tests que les SHA permettent de détruire au moins 100 000 bactéries et 10 000 levures et virus dans le temps de contact préconisé par le fabricant (ex : 30 s).

L'info en plus : des groupes de professionnels de santé hospitaliers, experts en désinfection et indépendants des fabricants, vérifient que les normes des SHA du marché ont été correctement réalisées (prodhybase).

Des études scientifiques montrent une baisse **significative** des infections associées aux soins (IAS) ($p < 0,05$) en lien avec l'utilisation des SHA (sont exclues les études financées par les fabricants).

<p>D Pittet 2000 - Ensemble d'une structure Taux d'IAS pour 100 admissions Avant mise en place des SHA : 16,9 % Après mise en place des SHA : 9,9 % Réduction des infections : 42 % Etude sur 4 ans</p>	<p>DM Zerr 2005 - Ensemble d'une structure Taux d'IAS à Rotavirus pour 1000 séjours Avant mise en place des SHA : 5,9 % Après mise en place des SHA : 2,2 % Réduction des infections : 63 % Etude sur 4 ans - 5118 patients</p>
<p>TA Le 2007 - 2 services de neurochirurgie Taux d'infections du site opératoire (incidence) Service A sans SHA (témoin) : 9,2 % Service B avec SHA (intervention) : 3,8 % Réduction des infections : 57 % Etude sur 13 mois - 786 patients</p>	<p>ML Grayson 2008 - 6 établissements Taux de bactériémies à S. aureus métri-R pour 100 séjours Avant mise en place des SHA : 0,05 % Après mise en place des SHA : 0,02 % Réduction des infections : 60 % Etude sur 4 ans</p>

T Herud 2009 - 20 services d'un établissement
Lien démontré entre l'augmentation de l'usage des SHA (litres/journée d'hospitalisation) et la diminution du taux d'IAS - Etude sur 8 ans - 27 248 patients

Quelles informations vous ont paru les plus convaincantes ?
 mécanismes d'action tests en laboratoire études scientifiques

Vos commentaires ? _____

CHIAS IDF - Diagnostic des freins à l'hygiène des mains et aux SHA - Doutes sur l'efficacité - juillet 2019 - p. 2/2

3

Tolérance

Objectifs :

- 1-Approfondir l'enquête sur les problèmes de tolérance
- 2- Faire passer des messages sur l'importance de prendre soin de ses mains

Méthode :

Recto : Mini-questionnaire qui permet au professionnel de décrire précisément son problème et l'amène à s'interroger sur ses pratiques = *acte préparatoire à un engagement*

SMA-DOC 1/Professionnels Unité/secteur/service : / /

Vous avez un problème de tolérance vis-à-vis des SMA : ce document est pour vous !

Vos mains sont à la fois un précieux outil de travail et un vecteur potentiel de transmission croisée. Vous, professionnel de santé, comme nous, hygiénistes, avons tout intérêt à ce que l'état cutané de vos mains soit préservé pour répondre à nos objectifs communs de qualité et de sécurité des soins. Pour mieux comprendre le problème que vous rencontrez, il est important de s'intéresser à deux aspects complémentaires : **au produit et à ses effets potentiels** ET **aux conditions dans lesquelles il est utilisé**.

Afin de nous aider à trouver des solutions adaptées aux problèmes rencontrés, merci d'indiquer ci-dessous ce que vous avez constaté et vos pratiques habituelles :

Le produit et ses effets (5 questions)	Vos pratiques (4 questions)
Nom du SMA qui vous pose problème : _____ 1-Quels sont les ou les effets constatés ? Effet principal (1 réponse): cutané ☐ respiratoire ☐ oculaire ☐ autre _____ Description du problème en quelques mots : _____ Ressenti (1 réponse): ☐ sensation d'inconfort, de gêne (sur votre peau ou votre attention des SMA) ☐ signes visibles d'intolérance (ex : peau lésée) (qui vous empêche d'utiliser les SMA) 2-Comment vous sentez le problème ? A quel ? ☐ à vos responsables ☐ à l'équipe d'hygiène ☐ au service de santé au travail ☐ à un dermatologue (consultation) ☐ à un autre professionnel : _____ ☐ problème non signalé	Vous êtes : ☐ une femme ☐ un homme Âgé(e) de /_____/ans, exerçant une profession : ☐ paramédicale ☐ médicale ☐ autre _____ Vous avez un terrain allergique ? ☐ oui ☐ non ENQUÊTE DE VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 3-Soins des mains réalisés-vous des crèmes hydratantes pour vos mains ? ☐ non, jamais ☐ oui, surtout l'hiver ou ☐ oui, toute l'année Si oui, nombre de fois par jour : /_____/_____ 4-Soins des mains : protégez-vous vos mains lors des situations « à risque » ? ☐ (froid, bricolage, jardinage, voyage...) ☐ dans tous les cas ☐ dans certains cas ☐ non, pas spécialement
Les mesures correctives (5 questions)	LORS DE VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
5-Des mesures correctives ont-elles été proposées à l'équipe d'hygiène (pour le diagnostic précis) ? ☐ traitement médical décisions ☐ bilan allergologique ☐ proposition d'un produit de remplacement ☐ rappel des bonnes pratiques d'usage des SMA ☐ autre mesure : _____ ☐ aucune mesure corrective	6-Comment le temps de lavage des mains à l'eau/SMA est-ce pour vous : une pratique fréquente (> 10 fois/jour) ? ☐ oui ☐ non une étape nécessaire avant la friction ? ☐ oui ☐ non 7-Concernant les gants, est-ce pour vous : de les enfiler sur les mains pas tout à fait sèches ? ☐ oui ☐ non de les porter de façon prolongée (> 30 min) ? ☐ oui ☐ non

5/10 IDP - Diagnostic des freins à l'hygiène des mains et aux SMA - Problème de tolérance - mai 2019 - p. 2/2

SMA-DOC 1/Professionnels Unité/secteur/service : / /

Votre contribution

Suite au remplissage du questionnaire, quelles mesures vous sentez-vous prêt(e) à tester pour essayer d'améliorer la situation ?

mieux protéger vos mains des risques de blessure
 hydrater davantage vos mains (crème) Personnellement

ne porter des gants que lorsque c'est nécessaire et juste le temps nécessaire
 veiller à enfiler les gants sur des mains sèches
 limiter le lavage à l'eau et au savon au strict nécessaire Dans le cadre de votre travail

A propos du lavage des mains à l'eau et au savon :
 Il est normal de rechercher une sensation de « mains propres » en réalisant un lavage à l'eau et au savon mais cette technique d'hygiène des mains n'est réellement nécessaire que pour les mains souillées, situation en général peu fréquente dans une journée de soins. Faites-vous plaisir avec un lavage à quelques moments précis de la journée (à l'arrivée, au moment du repas, en partant...); pour le reste, utilisez des SMA plus adaptées à la prévention de la transmission croisée.
 - **Evitez de faire un lavage avant une friction** peut se comprendre car selon l'adage bien connu « on ne désinfecte bien que ce qui est propre ». Toutefois, en routine, faire un lavage systématiquement avant une friction :
 • n'est pas utile (mains pas souillées en permanence, friction efficace même sans lavage préalable),
 • prend du temps,
 • est responsable de problèmes de tolérance (friction faite sur peau humide).

A propos des gants non stériles : ils sont très utiles pour se protéger ponctuellement d'un contact avec les liquides biologiques. Toutefois, un port prolongé de ces gants, qui favorise une macération, et/ou l'enfilage des gants sur des mains encore humides créent les conditions de survenue de problèmes cutanés.

En prenant soin de vos mains, vous augmentez vos chances de mieux tolérer les SMA

Nos perspectives

Grâce à vos réponses et celles de vos collègues, votre équipe d'hygiène :

- va pouvoir mieux identifier quel produit pose éventuellement problème, combien de professionnels sont concernés, la nature de l'inconfort ou de l'intolérance rapportés,
- et donc pouvoir, en toute connaissance de cause, en collaboration avec le service de santé au travail, prendre les mesures adaptées, qu'elles soient collectives (diffusion d'informations spécifiques) ou au cas par cas (consultations médicales, SMA de remplacement, conseils sur les crèmes...).

Votre problème est Notre problème : on s'occupe de vous !

5/10 IDP - Diagnostic des freins à l'hygiène des mains et aux SMA - Problème de tolérance - mai 2019 - p. 2/2

Verso :
 Proposition d'engagement
 Messages pédagogiques

Perspectives :

Un REX a été demandé aux utilisateurs de l'outil

Projet : outil de saisie informatique correspondant

Toxicité

Objectifs :

- 1- Etre transparent sur la composition des PHA
 - Substances CMR
 - Perturbateurs endocriniens
- 2- Rassurer sur les différentes craintes :
 - Pénétration de l'alcool
 - Effets toxiques
 - ...

SHA-DIC 3, Fiche Produit Unité/secteur/service : /

Vous avez des craintes vis-à-vis de la toxicité des SHA ?
Le moment est venu de la transparence :

Appréhendez ce que l'on sait sur le produit que vous utilisez actuellement

NON DU PRODUIT FABRICANT DISTRIBUTEUR

Produit Essence FPS

Intégré sur le site [Sunshades](#) (Ministère de l'environnement)

Composition du produit pH = 5,5

100%	Alcoolols
90%	Alcoolols
80%	Alcoolols
70%	Alcoolols
60%	Alcoolols
50%	Alcoolols
40%	Alcoolols
30%	Alcoolols
20%	Alcoolols
10%	Alcoolols

En cours d'élaboration (disponible avant fin 2019)

Produit non autorisé (à l'exception des produits autorisés par le règlement (UE) n° 1221/2011)	Produit autorisé	Produit non autorisé	Produit non autorisé
Produit non autorisé (à l'exception des produits autorisés par le règlement (UE) n° 1221/2011)	Produit autorisé	Produit non autorisé	Produit non autorisé
Produit non autorisé (à l'exception des produits autorisés par le règlement (UE) n° 1221/2011)	Produit autorisé	Produit non autorisé	Produit non autorisé
Produit non autorisé (à l'exception des produits autorisés par le règlement (UE) n° 1221/2011)	Produit autorisé	Produit non autorisé	Produit non autorisé

CMR et perturbateurs endocriniens Par courrier en date du 11/11/2012, le fabricant est chargé de leur absence dans la composition du produit.

Vérification de l'absence de TOXICITE : tests cutanés, oculaires et respiratoires réalisés

CMR	Type de test (aigu/chronique)	Références	Réalisé par	Conclusion

Vérification de la TOLERANCE : tests cutanés, oculaires et respiratoires réalisés

CMR	Type de test	Références	Réalisé par	Conclusion

CPias IDF - Diagnostic de l'état de l'hygiène des mains et des SHA - Centre sur le terrain - septembre 2019p. 2/2

Cf. atelier « Tolérance et toxicité »

Animé par Agnès Gaudichon
Pharmacien hygiéniste CPias IDF

Perception du risque infectieux

Réflexion en cours

Revue de littérature sur les approches psycho-comportementales

- Risque pour soi/risque pris pour autrui
- Quel risque est pris à ne pas faire une HDM ? Quelles conséquences selon les indications (IAS, diffusion ATBR)? Grave/pas grave ?
- Surestimation du risque par les experts ou sous-estimation par les professionnels ?
- Quantification du risque ?
- Bénéfice à ne pas faire HDM ?
- Prise de conscience de l'impact (nb de patients pris en charge)
- Perception du rôle de chacun ? Se mettre à la place de...

Mesure de l'acceptabilité des risques liés aux soins – CCECQA 2009

Cf. atelier « Perception du risque infectieux »

Animé par Valérie Dancin
Infirmière hygiéniste CPias IDF

Fréquence d'HDM demandée jugée trop élevée

Objectif : travailler sur les indications et opportunités d'HDM et de friction

2 approches possibles :

- **collective** → outil « IOF » du Grhym
« Identification des opportunités de friction »
- **individuelle** : document en cours d'élaboration

Fiches « action » à venir

Fin d'année 2019 :

- Toxicité
- Fréquence jugée trop élevée

Année 2020 :

- Perception du risque infectieux
- Influence du port de gants
- HDM oubliée → support de rappel au plus près du soin, nudges
- Organisation des soins et HDM → travail sur les interruptions de tâche
- Effet modèle → travail avec les cadres et médecins
- Formation initiale → travail avec les instituts de formation

Points communs et différences avec l'outil « Pulpe' Friction »

Point commun : outils qui s'intéressent aux freins (HDM/FHA)
 Diagnostic par service et par ES – 5 à 10 min par professionnel
 Cases à cocher – Outil informatique en ligne

	Diagnostic des freins (02/2019)	Pulpe' Friction (04/2019)
Mise au point de l'outil	Revue de la littérature internationale + échanges avec EOH et professionnels + thèse	Focus group Entretiens Psycho-sociologues
Phase de test	Tests dans 6 ES/EMS – 158 prof.	Tests ES/EMS
Cible	Professionnels	Professionnels + Patients
Préalable à l'étude des freins	Avis des professionnels sur leur relation à l'HDM et sur les 5 indications de l'OMS	Observance déclarée et avis sur 4 indications de l'OMS (échelle de 0 à 10)
Complément au diagnostic	Fiches « action » pour chaque frein	Plan d'action automatisé
Secteurs concernés	ES, ESMS, ville	ES et ESMS
Mode de recueil	Questionnaire anonyme remis à chaque professionnel	Enquêteur interroge au moins 50% des professionnels et des patients (Entretiens avec EOH, référent hygiène, MedCo, IDEC...)
Caractéristiques des professionnels	Tout professionnel, sexe, âge/génération, ancienneté, ...	Médical/paramédical
Nombre de freins étudiés/recueillis	Tous les freins identifiés sur 17 proposés (HDM + FHA) + Frein principal	2 à 3 freins maximum sur 13 proposés (FHA)

Diagnostic des freins	Pulpe' Friction
<p>Freins à l'HDM (en général)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Risque infectieux pas toujours perçu -Fréquence demandée jugée trop élevée -Influence du port de gants -Hygiène des mains oubliée -Autres priorités que l'hygiène des mains -Charge de travail/temps disponible -Influence des pratiques observées -Formation initiale insuffisante -Manque de formation continue -Faible engagement institutionnel <p>Freins spécifiques à l'utilisation des PHA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Doute sur l'efficacité de la friction -Problème de tolérance des SHA -Crainte vis-à-vis de la toxicité des SHA -Problème de réalisation de la gestuelle -Conditionnement peu pratique -Problème d'emplacement/visibilité -Problème de disponibilité des SHA 	<p>Geste professionnel non à risque</p> <p>Pas une priorité Manque de temps</p> <p>Manque d'information</p> <p>Pdt inconfortable/désagréable/allergie avérée Nocivité du pdt Ne sais pas comment faire (technique)</p> <p>Disponibilité du pdt Coût du pdt Pas concerné Pas convaincu de l'intérêt Pas l'habitude</p>

Identification des opportunités de friction (IOF) (GRHYM)

Point au 11/10/2019

IOF

Utilisation de l'outil

Nombre d'établissements	2017/18	2019	Nombres de services	2017/18	2019
Etablissements inscrits	74	102	Services enregistrés	56	115
Etablissements connectés	47	68	Nb de services par ES	1 à 7	1 à 17
% d'ES ayant mené la démarche dans plusieurs services	50%	89%	Médecine	7	24
Périodes créées	66	169	Chirurgie	4	17
Périodes validées (rapport)	28	85	SSR	6	19

IOF

Spécialités (volet)	MEDECINE (1)	CHIRURGIE (1)	SSR/chambre (1)	SSR/plateau technique (1b)
Nb de patients	323 pat.	124 pat.	393 pat.	123 pat.
Nb d'opportunités identifiées par les professionnels	7690 opp.	2849 opp.	6829 opp.	760 opp.
Nb moyen d'opp/JH - Prof	24 (22 services)	23 (10 services)	17 (17 services)	6 (2 services)
Valeur trouvée en 2018	24 (7 services)	24 (4 services)	13 (6 services)	4 (6 services)
Rappel ICSHA 3	10	12	8	
Nb moyen d'opp/JH - EOH	33 (2018 : 26)	25 (2018 : 21)	20 (2018 : 19 en chambre)	

Remerciements (2)

Etablissements ayant rempli le formulaire en ligne « Valorisation des actions sur l'HDM »

Caisson pédagogique
Implication patients **Jeux/Kermesse** **Flacons poche**
Ateliers
Création affiches **Chambre des erreurs**
Implication correspondants **Implication cadres**
Remise de lots/Tombola **Lâcher de ballons**

MATERNITÉ SAINTE FÉLICITÉ
 CMC AMBROISE PARE, HARTMANN ET PIERRE CHEREST
 POLYCLINIQUE DE HENIN BEAUMONT
 HÔPITAL PRIVÉ CLAUDE GALIEN
 CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS
 HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER
 POLYCLINIQUE MONTIER-LA-CELLE/ CLINIQUE DES URSULINES
 GCS PUBLIC PRIVÉ DE RADIOTHÉRAPIE DU LITTORAL JOLIOT CURIE
 CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE MONTGARDE
 CH RAMBOUILLET
 CLINIQUE LES TROIS SOLEILS
 FONDATION ROTHSCHILD
 CLINIQUE SAINT AME
 CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD
 GHSIF

Valorisation des actions sur l'hygiène des mains (HDM)

Mise à jour le 12 décembre 2018 Accueil > Surveillance / Évaluation > Valorisation actions HDM

Chaque année, les équipes d'hygiène des mains ont pour objectif de valoriser parfois l'objet d'une communication un niveau local. Parmi ces actions, certaines démarches ayant démontré leur efficacité auprès d'autres établissements. Afin de partager ces démarches, il vous est proposé de remplir le formulaire ci-dessous.

Evaluation de l'impact des actions ?

Consommation des PHA : 76% → 79%

Evaluation des pratiques (observance)

Quizz de connaissances

Nombre de participants

Outils : internes/Grephh/CPias

Vers une évaluation régionale de l'impact de nos actions

Besoin d'un outil harmonisé d'évaluation

→ intérêt à l'échelle locale et régionale

- Consommation des SHA : quel avenir ? représentativité ?
 - Systèmes automatisés : pratiques mais coûteux
 - Connaissances : utile mais ne préjuge pas des pratiques
 - Pratiques déclarées : fiabilité ?
 - Observation des pratiques : référence mais chronophage/biais
- Cf. exemples du Canada et de l'Australie

Comment appliquer ce type de démarche en IDF ?

Quick-audit HDM (GREPHH)

Point au 16/10/2019

Quick-audit

Bilan IDF (2019 : 1006 inscrits en France)

Ile-de-France	2017	2018		
ES ayant finalisé leur évaluation	270	206		
ES IDF acceptant de contribuer à une analyse multicentrique	28 ES (10%)	34 ES (17%)	↗	
Services	210	196		
Cohorte 2017-2018 : 13 ES				
Observations	7 558	9 021	↗	
Contexte de l'audit :				
Programme EOH	61%	45%		Ttes spé
Accompagnement ICSHA	29%	15%		Médecine Urg, Psy
Investigation	6%	24%	↗	SSPI
Après intervention (impact sur les pratiques)	0%	8%	↗	SMS
Autre contexte	0%	8%	↗	Médecine Réa

Evolution des résultats 2017-2018

Observance HDM	ENTREE / début de PEC		SORTIE / fin de PEC	
	2017	2018	2017	2018
Observations (N)	3 426	3 762 (+ 336)	4 132	5 100 (+ 968)
FHA seule	50,5%	52,6% (+ 2pts)	59,2%	63,3% (+ 4pts)
Lavage + FHA	1,1%	1,5%	1,4%	1,3%
Lavage seul	3,4%	2,1% (- 1pt)	7,6%	3,5% (- 4 pts)
Aucune HDM	45,0%	43,8% (- 1pt)	31,8%	31,8%
Patients en PC				
Aucune HDM		Autre PC	24,4%	19,1%
		PC C. difficile	9,1%	25%

Quick-audit

Cohorte 2017-2018 (13 ES)

Observance HDM	ENTREE / début de PEC		SORTIE / fin de PEC	
	2017	2018	2017	2018
Observations (N)	1 189	1 144	1 722 ↗	1 429 ↗
FHA seule	52,9%	54,5% ↗ (+ 1,5pts)	58,8%	62,4% ↗ (+ 3,5pts)
Lavage + FHA	< 1%	3,1% (+ 3 pts)	1,9%	3,8% ↗ (+ 2pts)
Lavage seul	3,0%	3,5%	9,7%	6,0% ↘ (-3,5pts)
Aucune HDM	43,2%	39,0% ↘ (- 4pts)	29,6%	27,8% ↘ (-2 pts)

Quick-audit

Cf. atelier « Evaluation des actions »

Animé par Delphine Verjat-Trannoy
Praticien hygiéniste CPias IDF