

LE LINGE HOSPITALIER

Draps, taies, couvertures, etc. sont traités suivant une procédure par l'hôpital.

LE LINGE PERSONNEL

▶ **S'il est entretenu par l'hôpital :**
même procédure que linge hospitalier.

▶ **S'il est entretenu par la famille:**
- **le manipuler avec des gants**, le transporter dans un sac plastique

- **si le linge supporte une $t^{\circ} \geq 60^{\circ}$**
Un simple lavage avec les produits lessiviels habituels suffit



LE LINGE PERSONNEL (suite)

- **si le linge ne supporte pas une $t^{\circ} \geq 60^{\circ}$**
 - vaporiser un produit acaricide sur chaque pièce de linge,
 - remettre le linge dans un sac plastique,
 - laisser en contact le temps préconisé par le fabricant,
 - procéder ensuite à l'entretien habituel en machine.
- **en absence de produit acaricide**
 - mettre directement le linge dans un sac plastique,
 - le laisser fermer hermétiquement pendant au moins 72 heures avant le traitement habituel de ce type de linge.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du personnel soignant.

Coordonnées de l'hôpital :

Vous
(ou l'un de vos proches)
êtes atteint
de la gale



Voici quelques informations et précautions simples d'hygiène

V2—décembre 2013

Groupe de travail :
K. Blanckaert, D. Landriu, G. Lemaire,
K. Lebascle, A. Carbone

Centre de Coordination de la Lutte contre
l'Infection Nosocomiale Paris-Nord
96 rue Didot, 75014 Paris

Site Internet : <http://www.cclinparisnord.org>

QU'EST-CE QUE LA GALE ?

La gale est une infection cutanée très contagieuse due à *Sarcoptes scabiei hominis*, parasite creusant des sillons dans la couche cornée de l'épiderme.

QUELS SONT LES MODES DE TRANSMISSION ?

La contamination est avant tout **inter humaine**, par contact cutané direct d'un sujet parasité à un autre sujet, mais aussi indirectement par l'intermédiaire de vêtements, de linge ou de la literie contaminés.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE ?

La dissémination du parasite est favorisée par la vie en **collectivité**. Les facteurs de risque de transmission sont les contacts rapprochés et la cohabitation d'un grand nombre de personnes dans un espace restreint.

TRAITEMENT*

Le plus souvent un traitement médicamenteux vous sera prescrit, il est à prendre à distance des repas. En cas de contre indication, un traitement local par badigeonnage, pulvérisation, ou application de crème sur le corps sera effectué.

* l'environnement (linge, literie, mobilier en tissu) sera également traité.

PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES

Afin d'éviter la transmission de la gale, vous devez être placé en chambre seule ou dans un secteur dédié.

Cette mesure durera jusqu'à la fin de la période de contagion (48 heures minimum après le début du traitement).

Une signalisation doit être apposée sur la porte de la chambre.

MESURES POUR LE PATIENT

- Procéder à une toilette et au changement de tous les vêtements quotidiennement.
- Ne pas vous déplacer hors de votre chambre



MESURES POUR LES VISITEURS


- Limiter le nombre de visiteurs pendant la période de contagion.
- Ne pas s'asseoir sur le lit du patient, ou déposer des effets personnels.
- Ne pas utiliser les toilettes de la chambre.
- Suivre les recommandations du personnel sur des précautions spécifiques (tenue de protection, hygiène des mains, traitement du linge...)

MESURES ESSENTIELLES

Hygiène des mains pour tous :
soignants, famille...

A l'entrée de la chambre :
désinfection des mains

A la sortie de la chambre :
lavage et désinfection des mains



Port d'équipements de protection et matériel à usage unique

Dès l'entrée de la chambre et à retirer **avant la sortie** de la chambre :

- Surblouse à manches longues
- Gants (friction hygiénique des mains dans la chambre si changement de gants)

Matériel à patient unique / usage unique

