

Les précautions standard

Focus sur les gants au bon moment et à bon escient



QUAND ?



Au plus près des soins / gestes :

- À risque de **piqûre/coupure**
- À risque de **contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses** ou la **peau lésée**
- Si **lésions cutanées** sur les mains du soignant
- Si contact avec des **produits chimiques**

COMMENT ?

Retirer les gants **dès la fin du soins / geste**



Se désinfecter les mains par **friction hydroalcoolique** :
→ **avant** le port des gants
→ **après** le retrait des gants

Mette les gants **immédiatement** avant le **soin / geste**



QUI ?

Les professionnels médicaux, paramédicaux, ASH...

Ne pas porter de gants :

- lors des soins sur **peau saine**, quel que soit le statut infectieux du patient / résident (y compris BMR/BHRe)
- dans les couloirs**

Ne pas désinfecter les gants, y compris avec un produit hydroalcoolique



ATTENTION AU MÉSUSAGE

POURQUOI ?

Pour protéger le soignant des **risques liés à l'exposition au sang**, aux **liquides biologiques** et aux **produits chimiques**

POINT DE VIGILANCE

- Changer de gants **entre chaque patient / résident**
- Changer de gants **entre 2 séquences de soin / geste** chez un même patient / résident

Port de gants non raisonné



Faux sentiment sécurité

Frein à l'hygiène des mains

Favorise la transmission croisée