

ENQUÊTE VACCINATION ANTIGRIPPALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 2018/2019

Connaissances des professionnels des
établissements médico-sociaux
d'Ile-de-France



1. CONNAISSANCES CONCERNANT LA GRIPPE, LES MASQUES ET USAGE DES MASQUES

38% CONNAISSENT LES
DIFFÉRENTS MODES DE
TRANSMISSION DE LA
GRIPPE

La grippe peut se transmettre par les sécrétions respiratoires, par contamination de l'environnement (couverts, poignées de portes...) et par voie manuportée.



43% SAVENT QUE LA GRIPPE
PEUT ÊTRE ASYMPTOMATIQUE

La grippe peut donc être contagieuse en l'absence de symptômes.



48% CITENT L'OBÉSITÉ
COMME FACTEUR DE RISQUE
DE GRIPPE GRAVE

La grippe peut avoir des conséquences sévères chez tous les patients. Certains patients présentent un risque plus élevé de grippe grave : Sujets âgés, enfants de moins de 6 mois, Personnes atteintes de maladies chroniques, personnes obèses...



81% CONNAISSENT
L'EFFICACITÉ DU MASQUE
CHIRURGICAL EN PREVENTION
DE LA GRIPPE

63% PENSENT À TORT QUE LE
MASQUE FFP2 EST INDIQUÉ EN
CAS DE GRIPPE

Le masque FFP2 n'est pas indiqué en cas de grippe, le masque chirurgical suffit.



94% ONT DES MASQUES À
DISPOSITION

SEULS 54 % EN PORTENT
S'ILS PRÉSENTENT DES
SYMPTÔMES
RESPIRATOIRES

Le port de masque chirurgical permet notamment de limiter la transmission respiratoire (éternuements, toux, postillons...)



EN PÉRIODE D'ÉPIDÉMIE,
22% PORTENT DES
MASQUES AU QUOTIDIEN

20% N'EN PORTENT JAMAIS

Le port de masque en cas de symptômes permet de réduire la transmission. Un masque doit être changé toutes les 3 heures.



2. CONNAISSANCES ET UTILISATION DU VACCIN ANTIGRIPPAL

38% SAVENT QUE LA RÉACTION AU SITE D'INJECTION EST L'EFFET INDÉSIRABLE LE PLUS FRÉQUENT DU VACCIN ANTIGRIPPAL

44% CONNAISSENT LE DÉLAI D'EFFICACITÉ DU VACCIN ANTIGRIPPAL

*L'allergie est un effet indésirable possible mais peu fréquent.
Le vaccin antigrippal est efficace 15 jours après l'injection.*



39% PENSENT À TORT QUE LE VACCIN PEUT DONNER LA GRIPPE

SEULEMENT 22% DES IDE MAIS 52% DES AS

Le vaccin ne peut en aucun cas provoquer la grippe, car il ne contient qu'une fraction inactivée du virus



LA MAJORITÉ SE VACCINE POUR SE PROTÉGER SOI MÊME

LES AUTRES MOTIFS AVANCÉS SONT LA PROTECTION DE LA FAMILLE, ET ENSUITE PROTÉGER SES PATIENTS

*La vaccination des professionnels de santé permet d'éviter la transmission aux personnes les plus fragiles.
La grippe est responsable de 9 000 décès/an en moyenne, dont plus de 90% surviennent chez des personnes de plus de 65 ans.*



LES PERSONNES REFUSANT LA VACCINATION L'EXPLIQUENT LE PLUS SOUVENT PAR LA PEUR DES EFFETS INDÉSIRABLES

LES MOTIFS DE REFUS DE VACCINATION DIFFÈRENT ENTRE AS ET IDE

Les préparations homéopathiques n'ont jamais démontré la moindre efficacité en prévention de la grippe



POUR PLUS D'INFORMATIONS :



VOUS POUVEZ CONSULTER LES SITES SUIVANTS:

-ENSEMBLE DES RÉSULTATS :
www.cpias-ile-de-france.fr/



-INFORMATIONS CONCERNANT LA VACCINATION :

www.vaccination-info-service.fr

