

Fiche-action n°3

Recueil des indicateurs de suivi de la campagne de prévention antigrippe

Le suivi des mesures mises en place pour prévenir l'épidémie de grippe en établissement médico-social nécessite le recueil, tout au long de la période, de 3 types d'indicateurs :

1. Les indicateurs concernant la vaccination des résidents et des professionnels

Afin de suivre la couverture vaccinale des résidents, il vous est proposé de recueillir chaque semaine le nombre de résidents vaccinés ainsi que le nombre de professionnels vaccinés à partir du lancement de la campagne de vaccination par l'Assurance Maladie. Un tableau Excel [9 – Tableau indicateurs - Vaccination.xlsx](#) vous est proposé avec un onglet « résidents » et un onglet « professionnels » qui permettent le calcul de la couverture vaccinale dès lors que vous aurez renseigné dans les cases jaunes correspondantes le nombre de résidents et le nombre de professionnels de votre structure. Ces % de couverture vaccinale vous permettront de mettre à jour semaine après semaine le « baromètre » de la vaccination qu'il vous est conseillé d'afficher à l'entrée de la structure.

2. Les indicateurs concernant les consommables nécessaires à la mise en place des mesures barrières

De la même manière, vous pouvez suivre la consommation des consommables de type masques et solutés hydro alcooliques (SHA) ainsi que la mise en place de TROD (tests rapides d'orientation diagnostique) et de chimio prophylaxie antivirale à l'aide du tableau Excel [9 – Tableau indicateurs - consommables.xlsx](#)

3. Les indicateurs concernant la survenue des cas d'infections respiratoires aiguës

Ces infections (comme les gastro-entérites aiguës) font l'objet d'une déclaration à l'ARS dès lors qu'il est survenu au moins 5 cas en 4 jours. Le tableau de suivi des cas d'infection respiratoire aiguë chez les résidents comme parmi le personnel [9 – Tableau de recensement des cas - IRA.xls](#) peut être utilisé pour un suivi systématique tout au long de la période.

L'ensemble de ces indicateurs permettra, après la période d'épidémie, et par comparaison d'une année sur l'autre, d'apprécier la progression de la structure dans la prévention de la grippe.

