

**Annexe 8.4 – Surveillance des consommations d’antibiotiques,  
résultats 2014 détaillés pour les MCO**

## Distribution des consommations d'antibiotiques en Médecine pour les MCO (N=165)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C+J01D	β-lactamines	46,5	217,8	283,1	383,6	1839,6
J01C	Pénicillines	41,8	160,7	213,6	321,4	1418,8
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,4	5,7
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	3,0	7,8	17,1	93,1
J01CA04	Amoxicilline	0,0	26,0	46,4	69,6	511,1
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	16,7	97,4	144,3	207,4	1405,4
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,9	3,4	9,1	53,7
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,1	1,8	162,6
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,8	65,8
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,0	27,2	45,6	65,0	514,2
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,7	2,1	6,7	45,3
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	24,5	40,2	59,4	514,2
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,7	2,1	6,7	45,3
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,8	3,9	65,8
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	15,7	32,6	48,2	189,7
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,3	2,1	6,3	410,6
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,2	1,6	4,6	410,6
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,2	88,7
J01DH	Pénèmes	0,0	0,6	2,5	6,2	85,8
J01DH51	Imipénème	0,0	0,3	2,0	5,6	78,3
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,3	3,2	25,2
J01E	Sulfamides	0,0	2,0	4,7	9,3	50,9
J01F	MLSK	0,0	10,0	18,0	31,6	601,2
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	2,6	6,9	13,7	251,1
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,5	2,1	35,7
J01FG	Streptogramines	0,0	3,7	6,7	11,9	343,3
J01G	Aminosides	0,0	3,6	7,2	12,9	276,0
J01GB06	Amikacine	0,0	0,7	2,0	4,8	200,1
J01GB03	Gentamicine	0,0	2,2	4,0	8,1	47,2
J01M	Quinolones	4,0	44,5	67,3	94,3	482,6
J01MB	Quinolones 1ère G	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
J01MA	Fluoroquinolones	4,0	44,5	67,3	94,3	482,6
J01MA01	Ofloxacin	0,0	12,3	23,4	43,6	219,6
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	8,1	15,5	30,2	185,2
J01MA12	Levofloxacine	0,0	1,7	6,4	18,9	114,0
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,3	2,9	7,3	42,4
J01XA	Glycopeptides	0,0	1,6	4,5	9,7	96,5
J01XA01	Vancomycine	0,0	1,5	3,9	9,3	96,5
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,3	7,6
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,6	4,6
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,4	22,5
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	2,4	6,4	11,7	65,4
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	3,4	8,6	16,9	60,5
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	1,8	5,9	137,9
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
J01	Consommation ATB systémiques	64,4	316,8	436,5	550,4	3 413,1
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	64,4	322,6	448,7	574,4	3 492,9

Distribution des consommations d'antibiotiques en **Chirurgie** pour les **MCO** (N=230)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C+J01D	β-lactamines	9,4	237,4	315,8	392,5	1185,9
J01C	Pénicillines	4,0	128,1	184,6	239,2	738,3
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,4	3,3
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	1,2	5,1	11,8	68,5
J01CA04	Amoxicilline	0,0	21,7	38,0	63,1	541,7
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	0,0	77,0	117,3	171,8	501,0
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,6	2,9	7,4	41,7
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	23,3	78,4	118,4	437,4
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,7	6,1	23,5	261,4
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,0	10,8	20,8	34,9	157,8
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,1	1,4	4,3	57,0
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	9,4	18,5	31,3	153,4
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,1	1,4	4,3	57,0
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	1,4	3,9	82,8
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	4,7	12,9	25,5	110,7
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,1	0,8	2,1	48,9
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,7	1,8	13,3
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9
J01DH	Pénèmes	0,0	0,3	1,6	4,3	33,1
J01DH51	Imipénème	0,0	0,2	1,5	3,6	33,1
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,1	3,9
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	1,2	38,7
J01E	Sulfamides	0,0	1,6	3,9	7,8	60,0
J01F	MLSK	0,0	6,4	10,8	16,2	115,0
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,3	1,6	4,2	101,4
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
J01FF	Lincosamides	0,0	1,4	3,0	5,8	56,3
J01FG	Streptogramines	0,0	1,2	2,9	5,9	46,5
J01G	Aminosides	0,0	10,6	17,8	31,9	120,3
J01GB06	Amikacine	0,0	0,5	2,0	5,6	27,4
J01GB03	Gentamicine	0,0	8,9	14,5	25,0	111,5
J01M	Quinolones	0,5	36,5	52,3	69,2	225,7
J01MB	Quinolones 1ère G	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
J01MA	Fluoroquinolones	0,5	36,4	52,3	69,2	225,7
J01MA01	Ofloxacin	0,0	10,2	20,8	36,2	123,2
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	4,3	11,0	23,4	96,4
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,3	3,0	8,7	215,2
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,6	3,0	7,3	50,6
J01XA	Glycopeptides	0,0	3,0	6,6	10,6	86,0
J01XA01	Vancomycine	0,0	2,9	5,9	9,8	76,0
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,2	26,8
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,4	29,5
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,7	33,6
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	1,2	4,0	8,6	138,5
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	5,3	14,7	27,8	143,7
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,3	5,3	11,1	99,9
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
J01	Consommation ATB systémiques	54,6	341,1	457,7	556,5	1 301,7
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	54,6	347,2	482,2	575,3	1 402,6

## Distribution des consommations d'antibiotiques en Réanimation pour les MCO (N=32)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C+J01D	β-lactamines	220,2	590,8	739,7	871,0	1243,8
J01C	Pénicillines	165,3	345,5	469,0	529,2	913,5
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,8	7,8
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	13,0	42,0	68,0	143,1
J01CA04	Amoxicilline	0,0	69,5	112,1	159,7	352,0
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	56,3	137,8	150,3	221,8	387,2
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,4	5,7	19,3
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	12,9	52,1	106,7	141,4	197,4
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	1,0	11,5
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,7	3,2	14,2	36,3
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	1,1	5,6	225,6
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,7	3,9	97,7
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	18,5	94,7	145,5	199,0	288,2
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,0	0,0	1,0	3,7
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	18,5	94,7	144,9	196,9	288,2
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	1,0	3,7
J01DD01	Cefotaxime	0,0	6,9	26,5	45,1	144,6
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	23,6	52,2	93,5	210,0
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	15,6	30,6	51,7	145,4
J01DD02	Ceftazidime	0,0	11,7	23,3	34,7	136,1
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	4,2	16,9	89,1
J01DH	Pénèmes	0,0	33,1	72,0	139,1	286,1
J01DH51	Imipénème	0,0	25,9	60,2	101,5	285,4
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	11,8	88,8
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,1	2,2	28,1
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	1,0	11,2
J01E	Sulfamides	0,0	5,7	14,5	35,1	122,8
J01F	MLSK	0,0	25,2	67,9	126,7	170,7
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	20,4	64,7	122,5	157,5
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,3	2,8	5,1	28,4
J01FG	Streptogramines	0,0	0,0	1,6	4,0	22,3
J01G	Aminosides	17,0	60,4	88,9	123,2	295,8
J01GB06	Amikacine	2,5	34,7	54,9	85,4	237,7
J01GB03	Gentamicine	4,3	16,1	30,7	46,1	110,5
J01M	Quinolones	37,8	108,0	132,4	217,8	479,7
J01MB	Quinolones 1ère G	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
J01MA	Fluoroquinolones	37,8	108,0	132,4	217,8	479,7
J01MA01	Ofloxacin	0,0	7,6	26,0	49,9	85,9
J01MA02	Ciprofloxacine	1,0	42,6	58,0	153,6	275,9
J01MA12	Levofloxacine	0,0	9,5	34,4	50,7	208,5
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	1,2	3,8	34,4
J01XA	Glycopeptides	2,5	38,5	52,0	92,9	178,1
J01XA01	Vancomycine	2,5	36,5	50,8	91,7	178,1
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,2	18,2
J01XX08	Linezolid	0,0	1,0	9,6	22,3	60,3
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	3,0	120,9
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	2,6	11,1	37,1
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,8	5,3	7,5	18,5
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	21,1	29,7	47,0	203,0
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
J04	Rifampicine	0,0	5,6	17,1	33,5	254,4
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
J01	Consommation ATB systémiques	436,3	934,4	1 394,4	1 514,3	2 127,5
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	439,5	945,4	1 438,6	1 555,3	2 181,9

Distribution des consommations d'antibiotiques en **Gynécologie-Obstétrique** pour les **MCO (N=82)**

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C+J01D	β-lactamines	34,4	179,3	233,6	330,9	772,6
J01C	Pénicillines	32,0	167,0	212,3	300,3	709,6
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,0	0,2	12,4
J01CA04	Amoxicilline	0,0	116,0	164,9	222,6	460,8
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	11,7	34,0	49,5	77,5	330,0
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,2	3,3	17,4	61,8
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,2	49,0
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,1	4,5	7,3	11,5	35,5
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	1,8	3,9	7,0	33,0
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	1,1	2,9	5,5	19,9
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	1,8	3,9	7,0	33,0
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,7	1,6	9,1
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	0,3	1,5	4,3	19,9
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	0,7	18,9
J01E	Sulfamides	0,0	0,0	0,0	0,6	43,7
J01F	MLSK	0,0	3,3	6,6	9,8	73,2
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	1,1	3,1	6,4	68,7
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,3	1,4	3,2	49,0
J01FG	Streptogramines	0,0	0,0	0,0	0,6	5,2
J01G	Aminosides	0,0	0,5	1,9	5,0	33,0
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,0	0,3	7,0
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,3	1,3	3,7	33,0
J01M	Quinolones	0,0	1,3	3,0	8,0	59,5
J01MB	Quinolones 1ère G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
J01MA	Fluoroquinolones	0,0	1,3	2,9	8,0	59,5
J01MA01	Ofloxacin	0,0	0,0	1,8	4,0	33,0
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	0,0	0,0	1,1	32,5
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	0,0	1,3	21,8
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,0	0,0	0,1	5,8
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,0	0,1	5,8
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,6	65,1
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,0	0,6	1,7	16,6
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,1	1,0	2,3	27,5
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
J01	Consommation ATB systémiques	42,5	200,7	252,4	370,2	981,8
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	42,7	212,4	261,2	372,8	986,8

Distribution des consommations d'antibiotiques en **Pédiatrie** pour les **MCO** (N=24)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C+J01D	β-lactamines	38,3	85,4	135,6	209,1	429,4
J01C	Pénicillines	31,1	66,8	116,0	175,6	378,5
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,0	1,7	15,9
J01CA04	Amoxicilline	13,9	60,1	75,3	113,9	378,5
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	0,0	0,0	4,2	62,3	137,1
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,0	0,1	4,8
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,2	24,8
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	5,3	15,2	22,6	43,9	107,2
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,0	0,0	2,6	8,5
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	5,3	14,5	22,6	42,2	98,7
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	2,6	8,5
J01DD01	Cefotaxime	3,2	10,9	16,6	27,8	59,5
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	0,2	2,8	12,3	46,5
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,2	28,5
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,0	0,1	28,5
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
J01E	Sulfamides	0,0	0,0	0,0	0,9	43,7
J01F	MLSK	0,0	0,0	0,2	10,8	63,2
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,0	0,0	10,8	56,4
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
J01FG	Streptogramines	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
J01G	Aminosides	0,7	3,4	6,9	12,2	52,6
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,3	3,6	26,3
J01GB03	Gentamicine	0,0	1,8	4,8	7,8	21,8
J01M	Quinolones	0,0	0,0	0,0	0,6	13,1
J01MB	Quinolones 1ère G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01MA	Fluoroquinolones	0,0	0,0	0,0	0,6	13,1
J01MA01	Ofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,1	7,8
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,0	0,9	1,8	4,0
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,8	1,6	3,2
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,0	0,0	2,9	22,5
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01	Consommation ATB systémiques	39,1	89,4	164,4	249,1	484,1
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	39,1	89,4	165,8	251,5	489,2

## Distribution des consommations d'antibiotiques en SSR pour les MCO (N=71)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C+J01D	β-lactamines	13,3	82,6	110,4	147,3	390,3
J01C	Pénicillines	10,1	71,5	98,5	129,9	346,5
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,8	16,8
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,1	1,4	4,1	19,5
J01CA04	Amoxicilline	0,0	17,1	29,5	50,0	176,8
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	5,0	38,3	59,9	80,1	197,6
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,3	1,3	14,3
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,2	20,6
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	1,5	6,7	11,0	20,3	117,4
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	1,3	3,2	6,6	46,6
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	2,9	6,3	11,6	90,5
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	1,3	3,2	6,6	46,6
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,0	0,2	4,4
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	2,4	5,4	9,0	90,5
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,2	0,7	7,9
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,2	0,6	6,5
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,2	2,3	15,1
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,2	1,6	13,1
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	2,4	15,6
J01E	Sulfamides	0,0	2,4	6,0	9,8	109,3
J01F	MLSK	0,0	7,5	11,4	16,9	118,7
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,8	2,3	4,3	75,5
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,9	4,5	21,0
J01FG	Streptogramines	0,0	2,7	4,6	8,0	43,2
J01G	Aminosides	0,0	0,2	0,6	1,7	8,8
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,2	0,7	3,9
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,0	0,3	0,6	6,8
J01M	Quinolones	5,7	20,6	29,5	48,6	120,9
J01MB	Quinolones 1ère G	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
J01MA	Fluoroquinolones	5,7	20,6	29,5	48,6	120,9
J01MA01	Ofloxacin	0,0	5,1	10,1	18,8	65,2
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	4,0	7,2	14,7	44,6
J01MA12	Levofloxacine	0,0	1,8	4,2	12,2	27,0
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,7	2,8	6,2	41,0
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,2	1,0	2,6	13,0
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,2	0,9	2,4	13,0
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,4	4,2
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,3	6,3
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,9	2,9	5,5	33,5
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,0	0,5	1,4	15,3
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,9	4,5	12,4	55,6
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
J01	Consommation ATB systémiques	20,3	139,0	168,0	244,3	602,8
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	21,0	144,9	183,7	267,6	612,5

## Distribution des consommations d'antibiotiques en SLD pour les MCO (N=7)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C+J01D	β-lactamines	23,2	38,8	48,3	54,5	61,9
J01C	Pénicillines	21,6	32,7	41,3	47,4	50,7
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8
J01CA04	Amoxicilline	0,0	1,5	7,5	12,8	14,5
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	21,0	24,0	33,3	36,7	38,7
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	1,6	3,4	6,4	7,6	11,6
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,0	0,4	0,8	1,8
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	1,6	2,9	6,4	7,2	9,8
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,4	0,8	1,8
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DD04	Ceftriaxone	1,6	2,7	6,4	7,2	8,4
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH	Pénèmes	0,0	0,2	0,5	0,9	1,3
J01DH51	Imipénème	0,0	0,2	0,5	0,7	1,3
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	1,4	3,3
J01E	Sulfamides	0,0	0,3	1,9	2,2	4,0
J01F	MLSK	0,0	2,2	5,5	9,7	56,5
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,2	2,2	5,2	45,1
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
J01FG	Streptogramines	0,0	0,9	1,9	6,0	11,4
J01G	Aminosides	0,0	0,1	0,4	0,5	0,8
J01GB06	Amikacine	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6
J01M	Quinolones	1,3	4,5	5,5	7,7	14,6
J01MB	Quinolones 1ère G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01MA	Fluoroquinolones	1,3	4,5	5,5	7,7	14,6
J01MA01	Ofloxacin	0,0	1,0	1,2	2,8	5,7
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	0,5	1,1	2,2	4,3
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,1	1,3	1,9	2,3
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	1,1	2,6	6,6
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,4	2,2	3,0	6,0
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,2	0,5	0,9	1,5
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01	Consommation ATB systémiques	25,0	59,4	72,9	75,9	124,8
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	25,0	61,4	75,2	80,6	124,8



Distribution des consommations d'antibiotiques en **Psychiatrie** pour les **MCO** (N=6)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C+J01D	β-lactamines	4,9	12,7	34,7	57,3	81,0
J01C	Pénicillines	4,9	10,6	33,7	57,3	79,1
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,0	0,5	8,5
J01CA04	Amoxicilline	0,0	5,6	12,8	20,2	31,6
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	1,8	6,9	16,6	26,5	58,3
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,5	2,2
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,8	2,8	14,1
J01E	Sulfamides	0,0	0,0	0,5	1,2	1,6
J01F	MLSK	0,0	0,5	1,6	2,8	7,0
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,1	0,6	1,1	2,9
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FG	Streptogramines	0,0	0,2	0,9	2,0	4,2
J01G	Aminosides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01M	Quinolones	0,0	4,1	5,4	12,0	17,7
J01MB	Quinolones 1ère G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01MA	Fluoroquinolones	0,0	4,1	5,4	12,0	17,7
J01MA01	Ofloxacin	0,0	1,4	1,9	3,3	12,5
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,0	0,4	1,6	2,6
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,1	0,8	2,9	9,7
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,1	0,6	0,7	2,6
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01	Consommation ATB systémiques	8,1	29,7	44,7	73,1	108,0
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	8,1	30,4	45,0	75,2	109,0